

LARS score – Síndrome de Resección Anterior Baja

	No, nunca	Sí, <1 vez por semana	Sí, >1 vez por semana	
¿Existen momentos en los que no puede controlar los gases por el ano?	0	4	7	
	No, nunca	Sí, <1 vez por semana	Sí, >1 vez por semana	
¿Ha presentado alguna vez pérdida accidental de deposiciones líquidas?	0	3	3	
	>7 veces por día (24 horas)	4-7 veces por día (24 horas)	1-3 veces por día (24 horas)	<1 vez por día (24 horas)
¿Con qué frecuencia va al baño a defecar?	4	2	0	5
	No, nunca	Sí, <1 vez por semana	Sí, >1 vez por semana	
¿Ha tenido que volver al baño a defecar antes de transcurrida una hora desde la última deposición?	0	9	11	
	No, nunca	Sí, <1 vez por semana	Sí, >1 vez por semana	
¿Alguna vez ha sentido una necesidad tan urgente de defecar que debe apurarse para llegar al baño?	0	11	16	
SIN LARS: 0-20 PUNTOS	LARS MENOR: 21-29 PUNTOS		LARS MAYOR: 30-42 PUNTOS	

Adaptada de: Abarca, C. P., & Fernández, M. (2021). Revista de Cirugía, 73(1), 80-90.

LARS score – Síndrome de Resección Anterior Baja

- Es una escala sencilla y rápida para valorar el Síndrome de Resección Anterior Baja y evaluar la efectividad de las diferentes estrategias terapéuticas puestas en marcha.
- Consta de 5 preguntas centradas en la sintomatología de los pacientes; la escala total puntúa de 0 a 42 puntos y se agrupan en 3 categorías:
 - Sin LARS
 - LARS Menor
 - LARS Mayor

Todos los derechos reservados por Coloplast Productos Médicos, S. A. Condesa de Venadito 5, 4ª planta - 28027 Madrid. España.
www.coloplast.es Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © 2026/03.